

**ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. V USIA 30 TAHUN AKSEPTOR KB SUNTIK 3
BULAN DENGAN AMENORHEA DI PUSKESMAS
BATU AJI KOTA BATAM TAHUN 2024**

Jesica Aritonang

Program Studi Diploma Tiga Kebidanan

Institut Kesehatan Mitra Bunda

Dosen Pembimbing

Bdn. Norma Jeepi. M. S. SiT., M. Kes

Dr. dr. H. Mawardi Badar, MM

Kata Kunci : Asuhan Kebidanan, Penggunaan KB Suntik 3 Bulan, *Amenorhea*

INTISARI

Amenorhea sekunder adalah keadaan tidak adanya menstruasi selama > 3 siklus menstruasi pada wanita yang menggunakan kontrasepsi suntik 3 bulan secara teratur. Angka kejadian pengguna kontrasepsi di dunia meningkat 57,4% pada tahun 2016. Menurut Riskesdas (2018) Jumlah pengguna kontrasepsi di Indonesia sebesar 99,6%. Angka penggunaan kontrasepsi suntik di Dunia berkisar 60,9%, Indonesia 99,6%, Kepulauan Riau 55%, di Kota Batam 45,74%. Tugas Akhir ini bertujuan agar penulis dapat memberikan Asuhan Kebidanan pada Ny. V Akseptor KB Suntik 3 Bulan dengan *Amenorea* di Puskesmas Batu Aji Kota Batam dengan menggunakan pola pikir 7 langkah varney dan pendokumentasian SOAP. Hasil dari studi kasus yang dilakukan selama 4 minggu berdasarkan hasil anamnesis pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Keluhan utama yang dirasakan ibu tidak haid selama 1 tahun saat menggunakan KB suntik 3 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah Ibu 120/70 mmHg dengan pemeriksaan penunjang PP Test negative (-). Asuhan yang dilakukan adalah memberikan konseling tentang amenorrhea dan memberhentikan suntik kb 3 bulan dengan mengkonsumsi Pil KB kombinasi dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan di Puskesmas Batu Aji. Berdasarkan hasil studi kasus dapat disimpulkan bahwa Ny. V dengan asuhan Akseptor KB suntik 3 bulan dengan amenorea dengan keadaan umum baik, keluhan ibu teratasi dan ibu mendapatkan menstruasi kembali.

**MIDWIFERY CARE IN NY. V AGE 30 YEARS AGE ACCEPTOR OF 3 MONTHS
INJECTION KB WITH AMENORRHEA AT PUSKESMAS**

BATU AJI BATAM CITY IN 2024

Jesica Aritonang
Midwifery Diploma Three Study Program
Mitra Bunda Health Institute

Supervisor
Bdn. Jeepi Norma. M. S. SiT., M. Kes
Dr. dr. H. Mawardi Badar, MM

Keywords: Midwifery Care, Use of 3 Month Injectable Birth Control, *Amenorrhoea*

ABSTRACT

Secondary *amenorrhea* is the absence of menstruation for > 3 menstrual cycles in women who use 3-month injectable contraception regularly. The incidence of contraceptive users in the world increased by 57.4% in 2016. According to Riskesdas (2018), the number of contraceptive users in Indonesia is 99.6%. The rate of use of injectable contraceptives in the world is around 60.9%, Indonesia 99.6%, Riau Islands 55%, in Batam City 45.74%. This final assignment aims to enable the author to provide midwifery care to Mrs. V Birth control acceptor for 3 month injections with amenorrhea at Batu Aji Community Health Center, Batam City using the 7 rare varney mindset and SOAP documentation. The results of the case study which was carried out for 4 weeks were based on the results of the physical examination history and supporting examinations. The main complaint felt by mothers was not menstruating for 1 year when using 3-month injectable birth control. The results of the mother's blood pressure examination were 120/70 mmHg with supporting examination PP Test negative (-). The care provided is providing counseling about amenorrhea and stopping 3-month birth control injections by taking combined birth control pills and collaborating with health workers at the Batu Aji Community Health Center. Based on the results of the case study, it can be concluded that Mrs. V, under the care of an injectable contraceptive acceptor for 3 months with amenorrhoea in good general condition, the mother's complaints were resolved and the mother had her menstruation again.