

**ASUHAN KEPERAWATAN MATERNITAS PADA IBU POST  
PARTUM DENGAN RUPTUR PERINEUM DENGAN MASALAH  
KEPERAWATAN RETENSI URINE DI RUMAH SAKIT HARAPAN  
BUNDA  
KOTA BATAM TAHUN 2025**

Fidea sari  
Program Studi Diploma Tiga Keperawatan  
Institut Kesehatan Mitra Bunda

Dosen Pembimbing  
Ns.Resi Novia, M.kep  
Ns.Hidayat Hartanto Permana S,Kep

Kata Kunci :Retensi urine, Kompres hangat, Infeksi Perineum  
Asuhan keperawatan

**INTISARI**

kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin terjadi pada 2,7 juta kasus. Perkiraan peningkatan angka kejadian pada tahun 2023 dengan taksiran mencapai 6,3 juta kasus. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan asuhan keperawatan dengan baik dalam pencegahan kejadian ruptur perineum. Angka kejadian ruptur perineum di Amerika mencapai 40%, sedangkan di Asia lebih tinggi yaitu mencapai 50%. Prevalensi ibu bersalin yang mengalami ruptur perineum disertai dengan infeksi luka operasi mencapai angka 5% dan perdarahan mencapai angka 7% serta kematian postpartum mencapai angka 8% (Pemiliana et al., 2019). Dengan metode wawancara dan pemeriksaan fisik sesuai format asuhan keperawatan. Hasil pengkajian pasien Ny.R Pasien Mengeluh tidak dapat mengeluarkan urinnnya sehingga sulit untuk berkemih spontan Diagnosa keperawatan yang muncul yaitu Retensi urine perencanaan keperawatan pada pasien bertujuan untuk dapat mengosongkan kandung kemih dengan retensi urine. Tindakan keperawatan dilakukan sesuai perencanaan. Berdasarkan hasil asuhan keperawatan yang telah dilakukan, diharapkan pada pasien dapat terus melakukan terapi kompres hangat sehingga dapat berkemih spontan mandiri dan tidak menimbulkan komplikasi penyakit lainnya.

# **MATERNITY NURSING CARE FOR POSTPARTUM MOTHERS WITH PERINEAL RUPTURE WITH NURSING PROBLEM OF URINARY RETENTION AT HARAPAN BUNDA HOSPITAL BATAM CITY IN 2025**

Fidea Sari

Program Studi Diploma Tiga Keperawatan  
Institut Kesehatan Mitra Bunda

Lecturers

Ns. Resi Novia, M.Kep

Ns. Hidayat Hartanto Permana, S.Kep

**Keyword:** Urine retention, Warm compress, Perineal infection,  
Nursing care

## **ABSTRACT**

The incidence of perineal rupture in postpartum mothers occurred in 2.7 million cases. The estimated increase in incidence in 2023 is projected to reach 6.3 million cases. This is influenced by a lack of knowledge in proper nursing care for the prevention of perineal rupture. The incidence rate of perineal rupture in America reaches 40%, while in Asia it is higher, reaching 50%. The prevalence of postpartum mothers experiencing perineal rupture accompanied by surgical wound infections reaches 5%, bleeding reaches 7%, and postpartum death reaches 8% (Pemiliana et al., 2019). With the interview method and physical examination according to the nursing care format. The assessment result of patient Mrs. R: the patient complained of not being able to urinate, making it difficult to void spontaneously. The nursing diagnosis that emerged was urinary retention. The nursing care plan for the patient aimed to empty the bladder with urinary retention. Nursing actions were carried out according to the plan. Based on the results of the nursing care that had been provided, it is expected that the patient can continue warm compress therapy so that she can urinate spontaneously and does not develop other disease complications.